



กลุ่มชุดดินที่ 38

กลุ่มชุดดินที่ 38



หน้าตัดดิน



บริเวณที่พบ

ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายละเอียด มีลักษณะการทับถมเป็นชั้นของตะกอนลำน้ำในแต่ละช่วงเวลา ดินมีสีน้ำตาล อาจพบจุดประสีน้ำตาลเข้มในดินชั้นล่างเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณสันดินริมน้ำที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 0 - 2 % เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีปานกลาง ระดับน้ำใต้ดินลึก ประมาณ 1 เมตร ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 5.0-7.0 ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ ท่าม่วง ป่าสัก และคอนเจดีย์ ชุมพลบุรี ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกพืชผักและสวนผลไม้ บางแห่งปลูกยาสูบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือ

ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย ในบางปีจะมีน้ำท่วมฉับพลันจากแม่น้ำและอาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขณะฝนทิ้งช่วง

ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช : กลุ่มชุดดินที่ 38 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ผลหลายชนิด แต่ไม่ค่อยเหมาะสมถึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการทำนา เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อำนวย

การจัดการกลุ่มชุดดินที่ 38

การปลูกพืชไร่ ปัญหาน้ำท่วมบ่า ทำพนังหรือเขื่อนกั้นน้ำ พร้อมทั้งจัดระบบการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกหรือ - ปรับระยะเวลาการปลูกพืชเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงน้ำท่วมบ่า ปัญหาดินค่อนข้างเป็นทราย และมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ ใสปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเทศบาล อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ หรือปลูกพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบลงดิน เมื่อปุ๋ยพืชสดอายุ 40-50 วัน หรือออกดอกประมาณ 50 %

ข้าวโพด ปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ใสปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 (ในกรณีดินมีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่ำ) อัตรา 50-75 กก./ไร่ หรือสูตร 16-16-18 อัตรา 30-40 กก./ไร่ ใสร่วมกับปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร่ ใสตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน โดยใส่รองก้นหลุมและโรยสองข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบ

ละหุ่ง ใสปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 หรือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 35-40 กก./ไร่ ใสตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน แบ่งครั้งใส่ โดยครั้งแรกใส่รองก้นหลุมและครั้งที่สองโรยรอบโคนต้นแล้วพรวนดินกลบ



งา ใสปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร่ ใส่ตอนปลูกและหลังปลูก 20-25 วัน
แบ่งครั้งใส่ ครั้งแรกใส่รองก้นหลุม ครั้งที่สองโรยข้างแถวปลูกหรือหว่านปุ๋ยทั้งหมดหลังปลูก ถ้าปลูกแบบหว่าน
ปอแก้ว ใสปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 25-30 กก./ไร่ โดยโรยข้างแถว
หลังปลูก 1 เดือน แล้วพรวนดินกลบ

ยาสูบ ใสปุ๋ยสูตร 6-20-16 อัตรา 100 กก./ไร่ โดยหว่านก่อนปลูก หรือแบ่งใส่แต่ส่วน
มากนิยมโรยสองข้างแถว ปลูกแล้วพรวนดินกลบ ถ้าแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ รองก้นหลุมและใส่หลังปลูก 20-25 วัน

ปลูกไม้ผล ปัญหาหน้าท่วมบ่า ทำพ่นหรือเชือกกันน้ำพร้อมทั้งจัดระบบการระบายน้ำออก
จากพื้นที่ปลูกในกรณีที่น่าท่วมขังนาน แต่ปกติแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังมากนักสำหรับไม้ผล
ปัญหาดินค่อนข้างเป็นทรายและมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ เตรียมหลุมปลูก ขนาด 50 x 50 x 50 ซม. เป็นอย่าง
น้อย คลุกเคล้าดินในหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 25-30 กก./หลุม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

มะม่วง ใสปุ๋ยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของจำนวนอายุ เช่น มะม่วงอายุ 10 ปี ใสปุ๋ยจำนวน
5 กก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 3 ครั้ง คือ 1 ใน 3 ส่วนใสปุ๋ยสูตร 13-13-21 ใส่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ครั้งที่สองใส่อีก 1
ใน 3 ส่วน ใสปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และปุ๋ยที่เหลือ 1 ใน 3 ส่วนใสปุ๋ยสูตร 12-
24-12 หรือ 8-24-24 ใส่ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม

มะละกอ ควรใสปุ๋ยสูตร 14-12-12 หรือ 20-15-15 อัตรา 1 กก./ต้น ระยะต้นอ่อนถึง
ก่อนออกดอก หลังจาก 1 ปีขึ้นไป ใส่ประมาณ 1-1.5 กก./ต้น

ฝรั่ง ใสปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตราประมาณ 1 กก./ต้น/ปี ควบคู่ไปกับการ
การใสปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 100 กก./ต้น

ส้ม ปีแรกใสปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 10-20 กก./ต้น และใสปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
150-200 กรัม/ต้น ใส่ 4-6 ครั้ง/ปี

-ปีที่ 2 ใสปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ต้น แบ่งใส่ 4 ครั้ง ๆ ละ 500
กรัม/ต้น -สำหรับส้มที่ติดผลแล้วใสปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ต้น/ปี แบ่งใส่ 4 ครั้งเท่า ๆ กัน ตามระยะเวลาดังนี้
ครั้งที่ 1 ใส่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่งแล้ว ครั้งที่ 2 ใส่ก่อนออกดอก 15 วัน ครั้งที่ 3 ใส่หลังออกดอก 2-3
เดือน ครั้งที่ 4 ใส่ก่อนเก็บผล 2-3 เดือน